

# ラクナールGプラス

販売名：ラクナールGプラス

## 開け口

30mL×3 第2類医薬品

### 【成分・分量】1日量(30mL×2)中

タウリン 2000mg、カンゾウエキス1000mg(原生薬カンゾウとして 4000mg)、ショウキョウ流エキス 1mL(原生薬ショウキョウとして 1000mg)、ニンジンエキス 60mg(原生薬ニンジンとして 666mg)、ピロキシリン塩酸塩(ビタミンB<sub>e</sub>) 50mg、パンテノール 30mg 添加物：白糖、果糖、アセシルファミンK、クエン酸、クエン酸Na、バラベン、安息香酸Na、エタノール、プロピレングリコール、香料  
アルコール0.3mL以下(30mL中)

### 【効能・効果】

滋養強壮、虚弱体質、肉体的疲労・病中病後・食欲不振・栄養障害・発熱性消耗性疾患・産前産後などの場合の栄養補給

### 【用法・用量】

成人(15歳以上)1回1瓶(30mL)を1日2回服用してください。服用間隔は4時間以上おいてください。○用法・用量を厳守すること。○15歳未満の小児は服用しないこと。

### 【保管及び取扱い上の注意】

(1)直射日光の当たらない涼しい所に保管すること。(2)小児の手の届かない所に保管すること。(3)他の容器に入れ替えないこと(誤用の原因になったり品質が変わる。)(4)使用期限を過ぎた製品は服用しないこと。

※本剤は生薬成分を配合していますので、沈降を生じることがあります。よく振ってから服用してください。

副作用被害救済制度 電話0120-149-931

発売元



天野商事株式会社

名古屋市中区丸の内三丁目13番12号

製造販売元



中外医薬生産株式会社

三重県伊賀市ゆめが丘7-5-5

お客様相談室：0595-21-3200

受付時間 9:00~17:00(土、日、祝日を除く)

### ⚠ 使用上の注意

#### ⊗ してはいけないこと

(守らないと現在の症状が悪化したり、副作用が起こりやすくなる。)  
長期連用しないこと

#### ■ 相談すること

- 次の人は服用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること  
(1)医師の治療を受けている人。(2)高齢者。(3)次の症状のある人。むくみ(4)次の診断を受けた人。心臓病、高血圧、腎臓病
- 服用後、次の症状があらわれた場合は副作用の可能性があるので、直ちに服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

関係部位	症状
皮膚	発疹・発赤、かゆみ

まれに下記の重篤な症状が起こることがある。その場合は直ちに医師の診療を受けること。

症状の名称	症状
偽アルドステロン症、ミオパチー	手足のだるさ、しびれ、つばり感やこわばりに加えて、脱力感、筋肉痛があらわれ、徐々に強くなる。

- 3.5~6日間服用しても症状がよくならない場合は服用を中止し、この製品を持って医師、薬剤師又は登録販売者に相談すること

製造番号

使用期限